

Después de la Anestesia General

Su hijo(a) podrá tener sueño entre tres o cuatro horas después de la anestesia.

Asegure al niño(a) con cuidado en un asiento infantil para carro o con el cinturón de seguridad durante el traslado. Un niño(a) sentado correctamente y derecho debe tener la cabeza en una posición ya sea hacia adelante, hacia atrás, o hacia un costado, pero nunca hacia abajo. Esta posición puede causar obstrucción de las vías respiratorias. Si el conductor maneja bruscamente o de una forma irregular, esto puede causar náuseas o vértigo en el niño(a). No se preocupe si el niño/niña duerme después de haber llegado a casa. Por favor acueste al niño(a) en su costado y revise a su hijo(a) cada 15 minutos mientras duerme.

Es posible que el niño(a) no coordine o este un poco mareado por el resto del día. No permita a su hijo(a) participar en juegos vigorosos ni le permita pasear en bicicleta, nadar, patinar, etc., por 24 horas. Por favor supervise con cuidado cualquier actividad el resto del día.

El niño(a) debe tomar líquidos tales como: agua, jugos, Kool-Aid, caldo, Jell-O (gelatina). NADA de LECHE durante la primera hora después de la anestesia. Si no tiene náusea ni vómito, el niño(a) puede tomar alimentos sólidos.

Si el niño(a) tiene náuseas o vómito después de la anestesia, pongalo a descansar y dele a beber líquidos en pequeños sorbos. Esta condición raras veces necesita tratamiento.

Es probable que el niño(a) tenga fiebre durante las primeras 24 horas después del tratamiento. Para aliviar esta condición, el niño(a) puede tomar Tylenol cada 3 o 4 horas, y tomar líquidos. Si el niño(a) obtiene una fiebre de más que 101F o 38C, por favor llame a su dentista.

Si el niño(a) fue anestesiado con "lidocaína," (anestesia local) por favor asegúrese de que el niño(a) no se muerda, o se estire los labios o la lengua. Estos tejidos son muy delicados y fácilmente se pueden inflamar o se les puede causar una pequeña ulcera al estarles causando un trauma continuo.

Su hijo(a) puede experimentar un poco de sangrado en el área donde la corona o anillo de diente ha sido colocado. Esta condición se ira reduciendo al cabo de 1 a 2 días. Por favor notifique a la oficina de su dentista si una corona se cae o esta suelta, y fijaremos una cita para la reposición de esta misma. Favor de traer con usted la corona para poderla volver a posicionar. El hilo dental tiene la capacidad de poder sujetarse a los bordes de una corona causando el desprendimiento de esta misma. Si esto sucede, instruya a su hijo en soltar el hilo dental en el lado del paladar y tirar del hilo por el lado del cachete, provocando que este pase entre los dientes.

Si su hijo(a) tiene selladores, coronas o mantenedores de espacio, por favor ayudenos a asegurar el éxito de estas restauraciones al mantener a su niño(a) en un recordatorio constante de que no debe de comer dulces pegajosos tales como: gomitas, Jolly Ranchers, Now or Laters, etc. Ni tampoco deba masticar hielo. Estos hábitos pueden romper las restauraciones que han sido puestas y provocar la necesidad de más tratamiento. Es probable que su hijo(a) le comente que siente que esta mordiendo de una manera extraña o "alto" o que siente como que sus dientes no encajan. Esto es normal y después de 2 o 3 días, no lo notará más.

Si a su hijo(a) se le ha hecho algún tipo de empaste o restauración en los dientes anteriores (del frente), favor de recordar a su niño(a) el no morder con estas comidas duras como: manzanas, zanahorias etc. o tampoco usar sus dientes de enfrente para abrir paquetes o desgarrar carne seca. (beef jerkey). Estos hábitos pueden provocar el rompimiento de los nuevos empastes o restauraciones causando la necesidad de más tratamiento.

Grandes empastes que se encuentran cerca del nervio del diente en ocasiones pueden estar sensibles a comidas o bebidas frías o calientes.

Por favor observe las siguientes instrucciones si a su niño(a) se le ha realizado alguna extracción:

1. No podrá tomar bebidas carbonizadas de 2-3 días.
2. No podrá sorber por medio de un popote de 2-3 días.
3. No deba fumar.
4. No consumir alimentos duros o afilados (chips, etc.) de 2/-3 días.
5. Se recomienda el consumo de alimentos suaves, ya sea fríos o calientes de 1-2 días.
6. Cualquier actividad que provoque calor en su hijo(a) deba de ser evitada de 1-2 días.
7. Un poco de sangrado en el área de la extracción es normal durante 2 o 3 días. Favor de poner gasas en el área de la extracción si el sangrado es fuerte y ordene a su niño(a) morderla con presión firme.

Favor de contactarse si:

1. Hay vómito después de 24 horas.
2. El niño tiene fiebre de más que 101F/38C o si tiene fiebre por más de 24 horas.
3. Si tiene dificultad para respirar.
4. Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación.

Su dentista lo contactara la tarde después de la cirugía de su hijo(a) para asegurarse de la salud de su hijo(a).