



INSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO DENTAL

Por la seguridad de su hijo y para evitar complicaciones durante la cita, lea atentamente esta información. Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la próxima cita de sedación de su hijo o estas instrucciones.

INSTRUCCIONES PREVIAS A LA CITA

2 SEMANAS ANTES DE LA CITA

Llámenos si tiene cambios en la salud de su hijo, incluidos:

- virus o problemas de las vías respiratorias superiores
- piojos, conjuntivitis, hiedra/roble venenosos
- congestión sinusal/congestión nasal
- traumatismos, úlceras o ampollas febriles en o cerca de la boca
- infección por MRSA
- otra cirugía médica/dental
- infecciones de oído
- estreptococo/dolor de garganta

INSTRUCCIONES PARA LA CITA

Comer/beber:

Dado que se puede usar óxido nitroso durante la cita de su hijo, evite darle comidas pesadas (incluidos alimentos fritos) antes de la cita para evitar malestar estomacal.

Cabello/ropa:

Por favor permita que su hijo use ropa cómoda. Le pedimos que su hijo no use coletas, ya que no le resulta cómodo recostarse en el sillón dental.

Limite los detalles de la cita de su hijo para minimizar la ansiedad y el miedo. Queremos que la experiencia de su hijo sea lo más placentera posible. Si nota que su hijo está ansioso o temeroso, háganoslo saber. Queremos que la experiencia de su hijo sea lo más placentera posible.

INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA CITA

LLAME AL 911 SI CREE QUE SU HIJO TIENE UNA EMERGENCIA MÉDICA RELACIONADA CON LA CITA

Si su hijo fue anestesiado con anestesia local, observe cómo mastica, tira y muerde los labios, las mejillas y la lengua. Estos tejidos son extremadamente frágiles y pueden ulcerarse fácilmente con un traumatismo continuo. Si esto ocurre, puede notar hinchazón o abrasiones en los tejidos.

Su hijo puede tener sangrado/supuración asociado al tratamiento dental. Esto debería desaparecer en 1 o 2 días.

Alterne acetaminofén e ibuprofeno cada 3 o 4 horas según sea necesario para posibles molestias relacionadas con el tratamiento de hoy. Utilice siempre dosis apropiadas para la edad y el peso siguiendo las pautas del fabricante. Nunca exceda la dosis máxima recomendada.

Si a su hijo le han realizado **extracciones**, siga las siguientes instrucciones:

- 1) Nada de bebidas carbonatadas durante 2-3 días
- 2) No chupar con pajita durante 2 o 3 días.
- 3) No comer alimentos picantes (patatas fritas, etc.) durante 2 o 3 días.
- 4) Consuma alimentos blandos fríos, frescos o calientes durante 1 o 2 días.
- 5) No fumar
- 6) Las actividades (incluidas la práctica deportiva y los juegos) que podrían provocar que su hijo tenga calor deben limitarse a 1 o 2 días.
- 7) Es normal que supure de leve a moderado durante 2 a 3 días. Coloque una gasa en el lugar de la extracción si el sangrado es abundante y haga que su hijo muerda con presión firme.

Notifique a nuestra oficina si sale un empaste o una corona y se le asignará un horario para evaluarlo. Por favor traiga la corona para volver a cementarla. Tenga cuidado ya que el hilo dental tiene el potencial de colgarse del margen de las coronas o empastes, lo que podría aflojarlos o eliminarlos.

Si a su hijo le colocaron selladores, empastes blancos o plateados, coronas o mantenedores de espacio, ayúdenos a garantizar el éxito de estas restauraciones recordándole a su hijo que no coma dulces pegajosos (ositos de goma, dulces Now & Later, Jolly Ranchers, etc.) o triturar sobre hielo. Estos hábitos pueden romper las restauraciones que se han colocado y podrían requerir un nuevo tratamiento. Su hijo puede decirle que muerde de manera "rara" o que sus dientes no encajan. Esto es normal y después de 2 o 3 días ya no debería notarse.

Si su hijo tuvo restauraciones en los dientes anteriores (frontales), recuérdole que no muerda alimentos duros (por ejemplo, manzanas o zanahorias crudas) ni que use los dientes frontales para abrir paquetes de papas fritas, romper la cecina, etc. puede romper las restauraciones que se han colocado y podría necesitar un nuevo tratamiento.

Los empastes grandes que están cerca del nervio del diente pueden ser sensibles a los alimentos y bebidas fríos y calientes durante algún tiempo.

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con el tratamiento contáctenos al 903-892-1200